

Contra-indicaties I Blauman Laser

Hieronder een lijst van de meest voorkomende contra-indicaties. Bij twijfel boek je best eerst een consult of raadpleeg je jouw arts.

Globaal of lokaal

- Huidkanker
- Zwangerschap
- Actieve huidinfecties en/of open wonden
- Verdachte naevi/melanomen
- Pacemaker
- Actieve psoriasis en eczeem (lokaal)
- Retinoiden of zuren (minder dan 1 week)
- Injectables (minder dan 2 weken)
- Melasma
- Vitiligo
- Onregelmatigheden te dicht bij de ogen
- Geschiedenis van keloïde littekens
- pmu / tatoeages / herpes (lokaal)
- Naevus flammeus of wijnvlek (te groot)
- Jonger dan 18 jaar
- Geen verdovende crèmes (verweken de huid)
- Recent zonnebankgebruik of zonvakantie (minder dan 1 maand)
- Overgevoelig aan hydrochinon of andere bleekmiddelen

Medicatie

- Cortisone (1 week wachten)
- Bloedverdunners (overleg arts)

Sommige medicijnen maken de huid overgevoelig voor zonlicht, en dus ook laserlicht:

- tegen acne (Ro-accutane, iso-tretoïne/ vit.A, ed.).
- medicijnen tegen somberheid en overspannenheid (anti-depressiva).
- een kuur van antibiotica (1 week wachten).

Zorg ervoor dat je geen fotosensibiliserende medicatie neemt op het moment dat de behandeling plaatsvindt. Indien je al jaren medicatie neemt en nooit enige overgevoeligheid voor licht hebt gemerkt (zonne-allergie), kunnen we eerst een testsessie uitvoeren om te zien hoe je huid reageert. Indien je geneesmiddelen gebruikt, lees altijd eerst de bijsluiter voor eventuele bijwerkingen en contra-indicaties.